

Liebig-Dispenser



Verdunster für FORMIVAR® 60% ad us. vet., zur Sommerbehandlung



Anwendungszeitpunkt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

- Sehr gut geeignet für Magazinbeuten
- Einfache Dosierung dank variablem Dochtpapier
- Einfachste Befüllung und Kontrolle durch gut sichtbarer Skala.

Anwendung

- ✓ Erste Behandlung Mitte/Ende Juli nach der Honigernte für 3–5 Tage
- ✓ Im Anschluss das Volk auffüttern
- ✓ Zweite Behandlung im September für 6–14 Tage

Dosierung

- ✓ Je nach Beutesystem pro Anwendung 50–200 ml mit FORMIVAR® 60%
- ✓ Je nach Tagestemperatur und Beutegrösse wird das bedruckte Dochtpapier angepasst.



1. Einstellen

Dochtpapier auf die Grundplatte legen. Muss je nach Tagestemperatur und Beutesystem angepasst werden.



2. Einfüllen

Tropfeinsatz entfernen und die Flasche mit der nötigen Dosierung auffüllen. Anschliessend Tropfeinsatz wieder aufstecken.



3. Aufsetzen

Flasche auf die Grundplatte mit Dochtpapier aufsetzen. Durch den Tropfeinsatz läuft die Ameisensäure auf das Dochtpapier.